



Purinature

MÉDICAMENTÉ

FAIT SUR  
COMMANDE (MTO)

# Purina® AMP - Purinature Dinde Début Plus - Médicamenté

Concassé fin

Les moulées Purina® Purinature offrent une nutrition complète à votre élevage. Les formules des moulées Purina Purinature contiennent une combinaison exclusive d'ingrédients, de vitamines prébiotiques et de minéraux organiques pour aider votre élevage à rester en bonne santé et à produire les œufs ou la viande dont votre famille a besoin.



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

### Alimentation complète pour les dindonneaux.

Comprend de l'Amprolium pour la prévention de la coccidiose.

Contient 24 % de protéines pour aider votre dindonneau de 4 semaines à grandir saine et forte.

Combinaison exclusive d'ingrédients, de prébiotiques et d'oligo-éléments organiques pour soutenir la performance de l'élevage.

Enrichi en vitamines et oligo-éléments organiques pour répondre aux besoins des dindonneaux au début de leur vie.

Prébiotiques et oligo-éléments organiques inclus pour favoriser la digestion et l'absorption des nutriments.

Sous forme de concassé pour faciliter la consommation par les dindonneaux.

# Purina® AMP - Purinature Dinde Début Plus - Médicamenté

TEXTURE	TAILLE DU SAC	STADE DE VIE
Concassé fin	25kg	0 à 4 semaines

## ANALYSE GARANTIE

PROTÉINES BRUTES	MIN.	24,0 %
MATIÈRES GRASSES BRUTES	MIN.	3,0 %
FIBRES BRUTES	MAX.	6,0 %
CALCIUM	MIN.	1,3 %
PHOSPHORE	MIN.	0,9 %

SODIUM	RÉEL	0,15 %
VITAMINE A	MIN.	10 000 UI/kg
VITAMINE D	MIN.	2 800 UI/kg
VITAMINE E	MIN.	30,0 UI/kg
SÉLÉNIUM		0,30 mg/kg

## MODE D'EMPLOI

**Donner cette moulée médicamenteuse comme seule ration à partir d'un jour d'âge jusqu'à 4 semaines d'âge.**

- Ne laissez pas les mangeoires se vider.
- Nettoyez régulièrement les mangeoires et les abreuvoirs.
- Fournir de l'eau fraîche et propre en permanence.
- Tout changement de ration doit se faire progressivement.

### IMPORTANT

Respectez des pratiques de gestion saines ainsi que des mesures de contrôle des maladies et de l'hygiène. Si vous avez des questions, contactez votre vétérinaire, votre détaillant ou votre représentant Purina.

### AVERTISSEMENT


Ne pas servir aux poules pondeuses en cours de production.

### ATTENTION

1. Ne pas utiliser de moulée médicamenteuse à l'amprolium pour traiter les foyers de coccidiose.
2. En cas de mortalité inattendue, obtenir un diagnostic précis et suivre les recommandations d'un vétérinaire ou d'un pathologiste de la volaille.
3. Respecter scrupuleusement le mode d'emploi.
4. Les aliments sont périssables. Stocker dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des rongeurs et des insectes. Ne pas donner d'aliments moisies ou infestés d'insectes aux animaux, car ils peuvent provoquer des maladies, des avortements ou la mort.

### CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les résultats individuels de l'utilisation de ce produit peuvent varier en fonction des différences dans les programmes de gestion, de santé, d'hygiène, d'élevage, de génétique et d'alimentation des clients. Par conséquent, Cargill Limited et ses détaillants ne garantissent pas les résultats individuels.



**PURINA®**